

表五：煎炸小食的丙烯酰胺含量

樣本編號	產品名稱	重量 (克) [1]	丙烯酰胺含量 (微克)	
			按每千克計 [2]	按整包裝 / 每份食物計 [3]
馬鈴薯及蕃薯製品				
71	炸蕃薯	180	< 10	< 1.8
72	麥當勞脆薯餅 McDonald's Hash Brown	60	400	24.0
73	麥當勞薯條 (中) McDonald's French Fries	100	520	52.0
74	肯得基家鄉雞脆薯格 KFC Criscut-R	180	850	153.0
麵粉製品				
75	越南春卷	66 (2件)	23	1.5
76	炸春卷 (2個樣本)	129 (3件)	34	4.4
77	炸雲吞 (3個樣本)	70 (3件)	25	1.8
78	牛蒠酥 (3個樣本)	130	37	4.8
79	油條 (4個樣本)	115	64	7.4
豆製品				
80	劉中興炸枝竹	100	< 10	< 1
81	華園沙爹牛絲燒腸 Wah Yuen Satay Beef Spring Roll	50	< 10	< 0.5
芋頭製品				
82	香煎芋絲糕	180 (3件)	49	8.8
83	荔芋卷	600	52	31.2
84	煎芋頭糕	75	53	4.0
85	芋角 (2個樣本)	138 (3件)	185	25.5
86	香酥荔茸鴨 (素食)	270	210	56.7
87	芋絲春卷	125 (3件)	540	67.5
中式傳統小食				
88	蛋散	289	12	3.5
89	迷你小鳳餅	150	45	6.8
90	芝麻瓦片	130	62	8.1
91	崩沙	240	68	16.3
92	米通	15	77	1.2
93	脆麻花	257	150	38.6
94	牛耳	264	380	100.3

註

[1] #76至#79、#85的樣本多於一個，搜集自不同食肆，重量及丙烯酰胺含量為各樣本的平均值。

[2] 以每千克食品計算。檢測限是10微克/千克。

[3] 以整包裝/每份食物計算，由於重量不一，消費者可按本身需要（如食用分量及頻次）來計算丙烯酰胺的攝取量，以及從哪種食品吸收最多丙烯酰胺。